FRIJOL COMUN

Clases : Bayo, Blanco, Canario, Guindo, Cápsula.

Cultivares Blanco: "Blanco Larán", "Larán Mejorado"

Canario: "Canario 2000", "Canario Centinelas"

Altura aproximada de planta : 0.50 a 0.70 m.

Abonamiento y Fertilización

Guano de corral a la preparación del terreno: 40 N - 60 P-OK Kg/ha a la siembra o antes de los 15 días de la siembra. No se aplican fertilizantes cuando hay abono residual proveniente del cultivo anterior.

Tratamiento de semillas : Emplear plaguicidas para control de enfermedades del suelo como Chupadera y ataques de gusano de tierra.

Características de siembra

Cantidad de semilla: 90 a 110 kg/ha.

a) Siembra manual
Hileras de plantas por surco : 1
Distanciamiento entre surcos : 0.70 m.
Distanciamiento entre golpes : 0.20 m.
Hileras de plantas por surco : 2
Distanciamiento entre surcos : 1.20 m
Distanciamiento entre golpes : 0.20 m.
Cantidad de semilla por golpe : 5, dejando 3 plantas al desahije.

b) Siembra a máquina:
Distanciamiento entre surcos : 0.70 m.
Distanciamiento para semilla : 0.05 (20 por metro lineal) dejando al desahije de 14 a 16 plantas p/m lineal

Riesgos : Regulados y frecuentes. De 3 a 5 riegos después del riego de machaco, con intervalos de 20 días según necesidades. Cultivar después del primer riego. Riego durante la floración provoca la caída de flores.

Control de malezas

Herbicidas pre-emergentes :

Afalón 50 o lorox 1.0 a 1.5 kg/ha
Gesagard 50 2.5 kg/ha.
Patorán 2.5 kg/ha
Sencor 0.5 kg/ha.

Virus: Mosaico común, Mosaico amarillo.

Cosechas : De 90 a 145 días.

Momentos : Cuando la mayoría de las vainas han cambiado a un color amarillo pajizo y quedan secas pero no quebradizas. Segar o arrancar las plantas y dejarlas en una era para su completo secado. Trillar cuando las vainas se abren al presionarlas.