FRIJOL PANAMITO (de verano)

Cultivares: "Seaway", "Saginaw", "Michelite", "Vista Florida".

Altura aproximada de planta: 0.50 a 0.70 m.

Abonamiento y Fertilización

Guano de corral a la preparación del terreno: 40N-40 P-OK Kg/ha a la siembra. No aplicar fertilizantes cuando hay abono residual proveniente del cultivo anterior.

Tratamiento de semillas : Emplear plaguicidas para control de enfermedades del suelo como Chupadera y ataques de gusano de tierra.

Características de siembra: Cantidad de semilla: 60 kg/ha.

a) Siembra manual

Hileras de plantas por surco : 1

Distanciamiento entre surcos: 0.60 m.

Distanciamiento entre golpes: 0.20 a 0.25 m.

Hileras de plantas por surco : 2

Distanciamiento entre surcos : 1.20 m Distanciamiento entre golpes : 0.20 m.

Cantidad de semilla por golpe : 5, dejando 3 plantas al desahije.

b) Siembra a máquina:

Distanciamiento entre surcos: 0.60 m.

Distanciamiento para semilla: 0.05 (20 por metro lineal) dejando al desahije de 14 a 16

plantas p/m lineal

Riesgos : Frecuentes en especial durante la floración y desarrollo de vainas. Se aplican de 3 a 5 después del riego de machaco.

Control de malezas

Herbicidas pre-emergentes: Afalón 50 1.0 a 1.5 kg/ha Gesagard 50 2.5 kg/ha.

Cosecha: De 3 a 3 1/2 meses en la costa en verano.

Momentos : Cuando las plantas se tornan de un color marrón y las vainas quedan secas, pero no quebradizas. Segar o arrancar las plantas y llevarlas a la era para su secado completo. Trillar cuando las vainas se abren al presionarlas.