ÑUÑA

Clases : Blanco, Amarillo, Rojo, Azul, Gris, Jasapeado, Pinto Negro y Blanco, Pinto Rojo y Blanco y otros.

Cultivares: "Q'osco Poroto", "Chec'che Local", "Blanco Local", "Angel Poroto".

Altura aproximada de planta: 1.70 a más.

Abonamiento y Fertilización : Cuando se cultiva asociado con maíz, se utiliza el guano de corral y los fertilizantes aplicados en este cultivo. En suelos deficientes en nitrógeno y fósforo aplicar de 40 a 60 kg. de nitrógeno y de 40 a 60 kg. de fósforo por ha. No se aplican fertilizantes cuando hay abono residual proveniente del cultivo anterior.

Tratamiento de semilla : Emplear plaguicidas para control de enfermedades del suelo como Chupadera y ataques de gusanos de tierra.

Características de siembra

Asociado con el maíz:

Cantidad de semilla: 30 kg/ha

Distanciamiento entre surcos: 0.80 m

Distanciamiento entre golpes : 1.20 m, intercalado con maíz. Cantidad de semilla por golpe : 3 a 4 dejar 3 plantas al desahije. Siembra : A los 15 días de la siembra de maíz o al primer aporque

Densidad de plantas : 31,000 por ha.

Cultivo con espalderas

Cantidad de semilla: 100 kg/ha

Distanciamiento entre surcos: 0.90 m Distanciamiento entre golpes: 0.30 m

Cantidad de semilla por golpe : 3 a 4, dejar 3 plantas al desahije.

Densidad de plantas : 110,000 por ha.

Riesgos : Regulados y frecuentes, según necesidades y como complemento del agua de lluvia. Mantener buena humedad en el suelo antes de la floración. Precipitación pluvial satisfactoria: 700 mm/año.

Control de malezas :

Herbicidas pre-emergentes: Afalón 50 o Lorox 1.0 a 1.5 kg/ha

Gesagard 50 2.5 kg/ha Patorán 2.5 kg/ha Sencor 0.5 kg/ha

Cosecha: De 6 a 8 meses. A menor temperatura mayor periodo vegetativo.

Momentos : Cuando la mayoría de las vainas han cambiado a un color amarillo pajizo quedando secas pero no quebradizas. Segar o arrancar las plantas y dejarlas en una era para su completo secado. Trillar cuando las vainas se abren al presionarlas.