

TANGELO

(Citrus reticulada x Citrus paradosis)

FAMILIA : Rutaceae

CENTRO DE ORIGEN : Posiblemente originaria de América del sur específicamente del Perú.

ZONAS DE PRODUCCIÓN : Ica, Junín, Lima.

PERIODO VEGETATIVO : Cultivo permanente con cosechas anuales, con una producción a partir del cuarto año de realizado el injerto.

VARIETADES PRINCIPALES : Orlando, Minneola, Sampson, Seminole.

REQUERIMIENTO DE CLIMA : Requieren de climas húmedos con temporadas semi-secas con temperaturas óptimas entre 18° y 29°C, con una humedad relativa del 87%.

SUELO APROPIADO : Prefieren suelos de profundidad efectiva, libre de pedregosidad y de buen drenaje con Ph de 5.5 a 6.5 respectivamente.

PROPAGACIÓN :

Patrón : Mandarina Cleopatra.

Injerto : Dancy, Clementina.

ASPECTOS AGROTECNICOS

Preparación del terreno : Libre de rastrojo y de malezas para el buen desarrollo de la planta.

Epoca de plantación : 4.0 m x 5.0 m entre plantas e hileras.

Fertilización : Agregar materia orgánica al momento del trasplante con dosis de fertilización de acuerdo a las necesidades de la planta.

Riegos : Frecuentes y moderados entre 8,000 y 9,000 m² de agua por hectárea, para riego por gravedad.

Labores culturales : Podas, deshierbos y limpieza de malezas.

COSECHA

Índice : Cuando el fruto de verde se torna a un color anaranjado o rosado pálido.

Epoca : Junio-agosto; presentándose en estos meses la mayor producción.

POST-COSECHA : Se almacenan a temperaturas de 0° a 5°C.