TARWI

Cultivares: Variedades locales.

Altura aproximada de planta: 1.00 a 1.80 m.

Abonamiento y Fertilización : Guano de corral a la preparación del terreno. A la siembra o emergencia de las plantas.

En suelos deficientes en nitrógeno y fósforo aplicar 40 kg. de nitrógeno y de 40 a 60 kg. de fósforo por ha. No se aplican fertlizantes cuando hay abono residual proveniente del cultivo anterior.

Tratamiento de semilla: Con fungicidas para control de enfermedades del suelo.

Características de siembra: 80 a 100 Kg. de semilla/ha

Distanciamiento entre surcos : 0.80 m. Distanciamiento entre golpes : 0.30 m.

Cantidad de semilla por golpe : 4, dejar 3 plantas al desahije.

Control de malezas

Herbicidas pre-emergentes: Afalón 2 kg/ha.

Tribunil 3 kg/ha.

Cosechas Precoces : 6 meses Tardías : hasta 11 meses

Maduración: Desigual dificulta la cosecha

Momento : Vainas cambia a un color amarillo y al mover las plantas las vainas producen un sonido de cascabel. Segar o arrancar las plantas y no arrancarlas, llevarlas a la era y

formar parvas para que terminen el secado. Trillar