

VID

(Vitis vinifera (Linn))

FAMILIA : Vitaceae

CENTRO DE PRODUCCIÓN : Entre el mar Caspio y el Asia menor

ZONAS DE PRODUCCIÓN : Ica, Lima, Cajamarca, Arequipa, Tacna

PERIODO VEGETATIVO : Planta perenne con cosechas anuales, con una producción a partir del tercer año de instalado.

VARIEDADES PRINCIPALES : Italia, Cardinal, River, Quebranta, Thompson y Flame, estas dos últimas variedades sin semilla.

REQUERIMIENTO DE CLIMA : Requieren de un clima tropical y sub-tropical. Temperaturas entre 7° y 24°C con una humedad relativa de 70% y 80%.

SUELO APROPIADO : Desarrollan exitosamente en suelos franco - arcillosos.

PROPAGACIÓN : Se propaga por vía sexual (semillas) o asexual (estacas, acodos e injertos)

ASPECTOS AGROTECNICOS

Preparación del terreno : Hoyos de plantada de 0.40 m x 0.40 con una profundidad de 0.60 m. adicionando material orgánico en hoyos d plantada, suelos bien mullidos con una nivelación adecuada.

Epoca de plantación : En los meses de agosto y setiembre.

Densidad de plantación : De 2.0 m entre plantas y 3.0 m. entre hileras.

Fertilización : Requieren de una dosis de fertilización en forma adecuada y oportuna, teniendo de agua, el cual varía según el clima, suelo, estado vegetativo de la planta y variedad cultivada.

En suelos arenosos riesgos frecuentes, en suelos pesados riesgos mas distanciados.

Labores culturales : Podas, deshierbos, eliminación de malezas.

COSECHA

Indice : La cosecha o vendimia, madurez comercial (cuando exista el balance en el sabor entre dulzura y acidez), fisiológica (aptos para germinar). Se deberá tener especial

cuidado debiendo eliminarse los racimos dañados por agentes físicos, químicos, mecánicos y/o biológicos.

Epoca : Meses de enero-abril concentrándose la mayor producción.

POST-COSECHA : Para su conservación poner a una temperatura de 0°C.