

MONITOREO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE CACAO


3° DÉCADA DE MAYO DE 2018 (21 al 31)



Etapas de crecimiento

La red de observaciones fenológicas del cultivo de cacao hasta el 31 de mayo del 2018 indica que en gran parte de la región amazónica las plantaciones se encuentran en diferentes fases fenológicas.

En la selva norte (San Martín), algunos campos continúan en la fase fenológica de fructificación, mientras que en las localidades como Pachiza, Huayabamba y Pilluana los campos se encuentran en maduración, en su mayoría. En Puerto Inca, Tingo María y Tulumayo (selva central) las plantaciones continúan en la fase de maduración y cosecha; en tanto que en las localidades de Tananta y Aucayacu predominan las fases fenológicas de botón floral y floración.



Tomar en cuenta

- * La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- * El mapa contiene información de la última fase del cultivo de cacao observada al 31 de mayo de 2018 y la fecha de inicio de dicha fase; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador.


Impactos del Clima



En general, las condiciones térmicas se mostraron sin mucha variación en la región amazónica; en tanto que las lluvias fueron deficientes generando humedad escasa y afectando las reservas hídricas, no obstante que en las localidades como Francisco de Orellana (Loreto); Moyobamba y Soritor (San Martín); Aucayacu, Aguaytía (Huánuco); Puerto Maldonado (Madre de Dios) se reportó

lluvias intensas,. En sectores donde hubo lluvias escasas, las condiciones térmicas favorecieron la maduración y la cosecha del cacao. Pero, desfavorable para el crecimiento de fruto, ya que esta fase necesita humedad para acumular peso y el tamaño de las mazorcas del cacao. Asimismo, retrasó el crecimiento de botones florales y la apertura de nuevas flores.

Variación Decadal del Índice de Humedad en la Selva




Sin embargo, en las localidades como Aucayacu (Huánuco) las lluvias reportadas promovieron la fase de botón floral y floración del cacao, disminuyendo la caída de flores y favoreciendo la polinización y cuajado de nuevos frutos.

de las enfermedades como la escoba de bruja, la moniliasis y la mazorca negra, especialmente en plantaciones que carecen de un mantenimiento agronómico adecuado, predios con sistemas de drenaje deficiente, excesos de sombras etc.

Por otro lado, continuaron las incidencias

Gráfico de anomalías de la lluvia en la Selva



Pronóstico Agrometeorológico

DEL 06 AL 13 DE JUNIO DE 2018



En los próximos días, se espera lluvias eventuales y ligeras en mayor parte de la región amazónica; en tanto que las condiciones térmicas se mantendrían estables; excepto en la selva sur, donde se espera un nuevo friaje, por lo que las temperaturas mínimas descenderían momentáneamente.

cacao. Sin embargo, las plantaciones que se encuentran en las fases fenológicas de botón floral, floración y fructificación requieren mayor humedad, por lo que una situación de lluvias deficientes ocasionaría caída de flores, problemas de cuajado y disminución en el crecimiento de los frutos.

Estas condiciones continuarán favoreciendo la fase de maduración y la cosecha del

Próxima Actualización 14 de junio de 2018

CONVENIO MARCO ESPECIFICO SENAMHI - MINAGRI

Subdirección de Predicción Agrometeorológica

Dirección de Agrometeorología
Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413

Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

Dirección General de Políticas Agrarias

Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria Telf: [511] 209-8800 anexo 4239 Consultas y Sugerencias: cmathews@minagri.gob.pe